

---


<b>Documento:</b>	<b>ANEXO 1211124a</b>
<b>Descriptor:</b>	<b>D1. Biodiversidade</b>
<b>Categoría 1</b>	<b>1.2. Hábitats</b>
<b>Categoría 2</b>	<b>1.2.1. Distribución dos hábitats</b>
<b>Categoría 3</b>	<b>1.2.1.1. Descrición dos bancos e/ou estratos definidos na mostraxe de bancos</b>
<b>Categoría 4</b>	<b>1.2.1.1.1. Descrición física</b>
<b>Categoría 5</b>	<b>1.2.1.1.1.2. Substratos duros</b>
<b>Categoría 6</b>	<b>1.2.1.1.1.2.4. Calidade comercial</b>
<b>Contidos</b>	Procedemento de descrición de liña de costa de substratos duros em función da calidade comercial da especie xestionada no plan
<b>Contidos 2</b>	
<b>Contidos 3</b>	
<b>Autor</b>	<b>José Manuel Parada Encisa</b>

---


Inclúese o procedemneto estandarizado de caracterización da costa empregado pola ferramenta ARouSA na aplicación de avaliación de stock de percebe. Incúese a plantilla de morfoloxías empregadas para a identificación de categoráis d epercebe e os resultados da aplicación do método de asignación de calidades ás diferentes morfoloxías en dúas confrarías. Procedementos similares poden ser empregados para a caractrización da costa en función da calidade doutras especies comerciais. Para especies diferentes do percebe a descrición da costa debe acompañarse dos estándares de calidade empregados a efectos de comparación coas caracterizacións doutras zonas.

### **Caracterización da costa en función da calidade do percebeextraído**

Os tramos incluídos en cada tipo de costa poden ser identificados polos recolectores en función da calidade dos percebes que capturan en cada un deles. Para a identificación dos tramos de costa realizaranse reunións cos recolectores co apoio de material cartográfico e fotografías aéreas e adoptando cinco categorías ou calidades de percebe: moi alta, alta, media, baixa e moi baixa. Para definir a morfoloxía dos percebes incluídos en cada categoría e facilitar posteriores comparacións entre diferentes zonas, presentaráselle aos percebeiros unha lámina con 18 figuras de percebe a escala 1:1 representativas das morfoloxías máis comúns (Molares *et al.*, 1987) (**Figura 1**) e se lles pedirá que clasifiquen o percebe producido en cada tramo de costa nunha das categorías.



**Figura 1.-** Cadro de morfoloxías de percebe en Galicia para a estandarización de categorías. A escala 1:1, a serie de categorías A ten un diámetro da base do capítulo (DBC) de 24 mm; o diámetro das categorías das series B e C é de 20 e 15 mm, respectivamente. Modificado de Molares *et al.* (1987).



**Figura 2.-** Asignación de morfologías ás categorías empregadas para a identificación de estratos. Resultados obtidos en Lira (óvalos) e Cariño (polígonos). Os números de 1 (moi alta) a 5 (moi baixa) identifican a calidade asignada ás morfologías incluídas dentro do óvalo ou o polígono que os contén.